

Convention:

Dans cet exposé, la lumière est supposée se déplacer de la gauche vers la droite.

I. Généralités sur les lentilles minces:

Une lentille est un milieu transparent limité par deux surfaces dont l'une au moins n'est pas plane.

- D: Diamètre d'ouverture.
- e: Epaisseur.

Une lentille est dite **mince** si son épaisseur **e** est faible devant son diamètre **D**.

1. Classification des lentilles minces:

Lentilles à bords minces:

biconvexe plan convexe ménisque convergent [symbole](#)

Lentilles à bords épais:

biconcave plan concave ménisque divergent [symbole](#)

2. Déviation des rayons lumineux:


Première loi de la réfraction: Lorsque la lumière passe d'un milieu d'indice de réfraction n_1 dans un milieu d'indice de réfraction n_2 ,

le rayon réfracté est situé dans le plan d'incidence.

Deuxième loi de la réfraction: Lorsque la lumière passe d'un milieu d'indice de réfraction n_1 dans un milieu d'indice de réfraction n_2 , les angles d'incidence et de réfraction sont liés par la relation:


$$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2).$$

3. Lentille convergente - Lentille divergente:



L'indice de réfraction du milieu transparent (n_1) étant supérieur à celui de l'air ($n_2=1$), l'angle i_2 est supérieur à l'angle i_1 (à cause de la relation: $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$). Les rayons lumineux issus de la lentille vont donc converger en un point.


Une lentille mince à bords minces est convergente.




L'indice de réfraction du milieu transparent (n_1) étant supérieur à celui de l'air ($n_2=1$), l'angle i_2 est ici encore supérieur à l'angle i_1 . (à cause de la relation: $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$). Les rayons lumineux issus de la lentille vont donc sembler diverger d'un point.

Une lentille mince à bords épais est divergente.

Dans la suite, les lentilles minces seront représentées de la façon suivante:



Lentille convergente




Lentille divergente

Cette année on limitera l'étude aux lentilles à bord minces appelés lentilles convergentes

II. Points et rayons particuliers:


1. Centre optique:



Un rayon passant par le centre optique d'une lentille mince n'est pas dévié.


2. Foyers principaux:

Foyer principal image:



Tout rayon incident parallèle à l'axe principal d'une **lentille convergente** émerge en passant par le **foyer principal image F'**.

Foyer principal objet:



Tout rayon incident passant par le **foyer principal objet F** d'une **lentille convergente** émerge parallèlement à l'axe principal de cette lentille.

3. Distance focale:

On appelle distance focale la grandeur $f' = \overline{OF'}$.

Remarque: Si $f' > 0$, la lentille est convergente. Si $f' < 0$, la lentille est divergente.

4. Vergence:


On appelle vergence C d'une lentille l'inverse de sa distance focale. La vergence s'exprime en dioptries (δ).

$$C = \frac{1}{f'}$$

m.

III. Images et objets:


1. Qu'est-ce qu'un objet? un objet est formé d'un ensemble de points objets. Ici l'objet AB est un objet plan perpendiculaire à l'axe optique.



On appelle objet ponctuel le point d'intersection des rayons incidents où de leur prolongement.

Un objet est **réel** si tous les rayons qui lui parviennent sont réels (il n'est pas nécessaire de les prolonger jusqu'à l'objet).


Si un objet est réel, le faisceau incident issu de celui-ci est divergent et de ce fait $\overline{OA} < 0$ (**un objet réel est situé à gauche de la lentille**).



Un objet est **virtuel** si au moins un des rayons qui lui parviennent est virtuel (il est nécessaire de le prolonger jusqu'à l'objet).

Si un objet est virtuel, le faisceau incident issu de celui-ci est convergent et de ce fait $\overline{OA} > 0$ (**un objet virtuel est situé à droite de la lentille**).


2. Qu'est-ce qu'une image? L'image d'un point objet par un système optique est un point image. L'image d'un objet est formée de l'ensemble des points images de chacun des points de cet objet.



On appelle image ponctuelle le point d'intersection des rayons émergents où de leur prolongement.

Une image est **réelle** si tous les rayons qui lui parviennent sont réels (il n'est pas nécessaire de les prolonger jusqu'à l'image).

Si une image A' est réelle, le faisceau émergent converge vers l'image et de ce fait $\overline{OA'} > L$ (**une image réelle est située à droite de la lentille**).



Un image est **virtuelle** si au moins un des rayons qui lui parviennent est virtuel (il est nécessaire de le prolonger jusqu'à l'image).

Si une image A' est virtuelle, le faisceau émergent diverge à partir de l'image et de ce fait $\overline{OA'} < L$ (**une image virtuelle est située à gauche de la lentille**).

IV. Construction de l'image d'un objet:

1. Méthode:

Un objet plan AB perpendiculaire à l'axe optique donne par une lentille mince utilisée dans les conditions de Gauss (système optique aplanétique) une image A'B' elle aussi plane et perpendiculaire à l'axe optique. Il suffit donc de déterminer l'image d'un point de l'objet pour construire l'image de l'objet tout entier.


Pour déterminer graphiquement la position de l'image d'un objet par une lentille, il suffit de tracer le trajet de quelques rayons issus de cet objet (deux suffisent) en appliquant les règles suivantes:

- Un rayon passant par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié.
- Un rayon parallèle à l'axe principal d'une lentille émerge en passant par le (ou en semblant provenir du) foyer principal image F'.
- Un rayon passant (ou semblant passer) par le foyer principal objet émerge de la lentille parallèlement à son axe principal.


2. Application:

Rechercher l'image A'B' de l'objet AB et conclure dans les cas suivants.


a) objet réel placé avant le foyer objet




b) objet réel placé entre le foyer objet et la lentille



c) Objet situé à l'infini




d) Objet situé dans le plan focal objet



V. Relations des lentilles minces:

1. Convention de signe:



2. Relation de conjugaison:

Si l'objet est noté A et l'image A', on montre que:

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'}$$

En posant $\overline{OA} = p$ et $\overline{OA'} = p'$, on obtient:

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$$

3. Relation de grandissement:

Soit un objet AB d'image A'B'. On appelle grandissement la grandeur:

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$$

Remarques:

Si $\gamma > 0$, l'image est droite par rapport à l'objet.

Si $\gamma < 0$, l'image est inversée par rapport à l'objet

On montre que:

$$\gamma = \frac{OA'}{OA}$$